



ITSAP
INSTITUT DE L'ABEILLE

Mallette Pédagogique à destination des ruchers-école

Document annexe 2 – Glossaire



acta
MEMBRE
DU RÉSEAU

Avec le soutien de :



FranceAgriMer



Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation



www.itsap.asso.fr

Glossaire

Direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations (DD(SC)PP) : autorité sanitaire chargée notamment de la gestion des maladies apicoles de première catégorie.

Essaimage : Départ de la reine et d'une partie de la population de la ruche, pour former une nouvelle colonie.

Glandes hypopharyngiennes : Glandes chez l'ouvrière nourrice qui produisent la gelée royale, appelées aussi « glandes mammaires ».

Glande de Nassanov : glande située à l'extrémité de l'abdomen des ouvrières qui permet de battre le rappel et de regrouper la colonie.

Hydroxymethylfurfural (HMF) : produit qui augmente avec la durée du stockage ou le chauffage du miel. Il est corrélé avec une altération des propriétés du miel.

Glossaire

Imago : Stade final de développement d'un insecte. Se dit notamment de l'abeille naissante.

Léchage (des hausses, des cadres, etc) : Se dit de l'opération qui consiste à faire nettoyer par les abeilles les dernières traces de miel après l'extraction. Cette pratique peut provoquer un comportement de pillage et d'agressivité.

Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) : mesures permettant d'accompagner les exploitations agricoles qui s'engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu'elles sont menacées de disparition. En apiculture, il n'est possible de solliciter les MAEC qu'à partir de 72 colonies.

Maturateur : Récipient vertical (le plus souvent en acier inoxydable) dans lequel le miel séjourne quelques jours afin qu'il decante et que les petites particules de cire et les bulles d'air remontent à la surface.

Glossaire

Nourrisseur : Espace permettant de réceptionner la nourriture, sous forme liquide ou solide, que l'apiculteur est susceptible d'apporter à la colonie. Le nourrisseur peut être un cadre creux, un abreuvoir à l'entrée ou un plateau placé au-dessus de la ruche.

Pain d'abeille : Mélange de miel et de pollen stocké dans les cellules et enrichi par une fermentation lactique.

Technicien Sanitaire Apicole (TSA) : les techniciens sanitaires apicoles, justifient de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. Le TSA est libre de contacter le ou les vétérinaires de son choix pour proposer ses services (ref. : article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime).

Trophallaxie : Échange de nourriture effectué par toutes les castes de la ruche.

Varroas phorétiques : les varroas phorétiques sont les varroas adultes qui, entre deux phases de reproduction, émergent avec la désoperculation des cellules d'abeilles et parasitent les abeilles adultes.